

Guía asistencial MMRR

GUÍA CLÍNICA ASISTENCIAL PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE EN RECAÍDA Y REFRACTARIO CON POMALIDOMIDA, CICLOFOSFAMIDA Y DEXAMETASONA ASOCIADO O NO A CLARITROMICINA EN FUNCIÓN DE LA RESPUESTA CLÍNICA (PoCyDex-C).

Queridos amigos del GEM,

Como muy bien sabéis Pomalidomida en combinación con Dexametasona ha sido recientemente aprobada para pacientes con mieloma que hayan recibido al menos dos líneas de tratamiento previas (incluyendo bortezomib y lenalidomida) y que hayan progresado a la última línea de tratamiento. Con esta combinación la tasa de respuestas es del 30% y la PFS de 4 meses. Datos recientes indican que la asociación de ciclofosfamida aumenta las respuestas a un 60% y la PFS a 9 meses. También hay datos con claritromicina que sugieren mayor eficacia. Con el fin de optimizar el uso de este fármaco en términos de eficacia/coste, hemos elaborado una guía asistencial.

Esperamos que las orientaciones de esta Guía Clínica Asistencial ayuden a nuestros pacientes.

Jesús San Miguel

[Guía Asistencial MMRR](#)